

Königliche Gartenbibliothek Herrenhausen (KGBH) - Handschriften

Sign.: KGBH-28

Verfasser: Masson, Francis [1741-1805]

Schreiber: Wendland, Heinrich Ludolph [1792-1869]

Titel: *Stapelia novae*, or a collection of several new species of that genus discovered in the interior of Afrika

Titel i. Vorlage:

Sprache: engl., lat.

Erklärende Bemerkungen: Bl. 2. Titel, Bl. 3. Widmung an den König Georg III von Großbritannien, Bl. 4-6. Vorwort, Bl. 6v-67. Beschreibungen und Abbildungen von 41 *Stapelia*-Arten, Bl. 68. Inhaltsverzeichnis. Systematik: Klasse: Magnoliophyta, Unterklasse: Asteridae (Asternähnliche), Ordnung: Gentianales (Enzianartige), Familie: Apocynaceae (Hundsgiftgewächse), Unterfamilie: Asclepiadoideae (Seidenpflanzengewächse), Tribus: Ceropogoneae, Untertribus: Stapeliinae, Gattung: *Stapelia* (Aasblumen), Art: (Nr. 1-41; Zeichnungen Bl.)

1. *Stapelia ciliata* Thunb. = *Orbea ciliata* (Thunb.) L. C. Leach (Bl. 7)
2. *Stapelia reticulata* = *Huernia guttata* (Masson) Haw. subsp. *reticulata* (Masson) Bruyns (Bl. 8v)
3. *Stapelia venusta* = *Huernia guttata* (Masson) Haw. subsp. *guttata* (Masson) Haworth (Bl. 10)
4. *Stapelia guttata* = *Huernia guttata* (Masson) subsp. *guttata* (masson) Haworth (Bl. 11v)
5. *Stapelia humilis* = *Huernia humilis* (Masson) Haworth (Bl. 13)
6. *Stapelia campanulata* = *Huernia barbata* (Masson) Haw. subsp. *barbata*; Syn.: *Huernia campanulata* (Masson) Haworth (Bl. 14v)
7. *Stapelia barbata* = *Huernia barbata* (Masson) Haw. subsp. *barbata* (Bl. 16)
8. *Stapelia verrucosa* = *Stapelia verrucosa* Masson (Bl. 17v)
9. *Stapelia irrogata* = *Orbea verrucosa* (Masson) L. C. Leach (Bl. 19)
10. *Stapelia revoluta* = *Tromotriche revoluta* (Masson) Haworth (Bl. 20v)
11. *Stapelia grandiflora* = *Stapelia grandiflora* Masson (Bl. 22) [gefaltet]
12. *Stapelia ambigua* = *Satpelia grandiflora* Masson (Bl. 23v)
13. *Stapelia pulvinata* = *Stapelia pulvinata* Masson; *Stapelia hirsuta* var. *hirsuta* L. (Bl. 25) [gefaltet]
14. *Stapelia Asterias* = *Stapelia asterias* Masson; *Stapelia hirsuta* var. *hirsuta* L. (Bl. 26v)
15. *Stapelia gemmiflora* = *Tridentea gemmiflora* (Masson) Haworth (Bl. 28)
16. *Stapelia vetula* = *Stapelia hirsuta* L. Var. *vetula* (Masson) Bruyns (Bl. 29v)
17. *Stapelia acuminata* = *Stapelia acuminata* Masson (Bl. 31)

18. *Stapelia concinna* = *Stapelia concinna* Masson (Bl. 32v)
19. *Stapelia grandiflora* = *Stapelia grandiflora* Masson (Bl. 34)
20. *Stapelia rufa* = *Stapelia rufa* Masson (Bl. 35v)
21. *Stapelia pedunculata* = *Stapelia pedunculata* Masson (Bl. 37)
22. *Stapelia divaricata* = *Stapelia divaricata* Masson (Bl. 38v)
23. *Stapelia pilifera* Thum. = *Hoodia pilifera* (L.f.) Plowes subsp. *pilifera* ? (Bl. 40)
24. *Stapelia punctata* = *Piaranthus punctatus* (masson) R. Br. var. *punctatus* (Bl. 41v)
25. *Stapelia geminata* = *Stapelia geminata* Masson; syn.: *Piaranthus geminatus* (Masson) N. E. Brown (Bl.43)
26. *Stapelia decora* = *Orbea decora* (Masson) Steud.; syn.: *Piaranthus decorus* N.E. Brown (Bl. 44v)
27. *Stapelia elegans* = *Duvalia elegans* (Masson) Haworth (Bl. 46)
28. *Stapelia reclinata* = *Duvalia reclinata* (Masson) Haworth (Bl. 47v)
29. *Stapelia caespitosa* = *Duvalia caespitosa* (Masson) Haworth (Bl. 49)
30. *Stapelia articulata* Ait. = *Pectinaria articulata* (Aiton) Haw. subsp. *articolata* (Bl. 50v)
31. *Stapelia pulla* Ait. = *Quaqua mammillaris* (L.) Bruyns (Bl. 52)
32. *Stapelia ramosa* = *Quaqua ramosa* (Masson) Bruyns; syn. *Caralluma ramosa* (Masson) N. E. Brown (Bl. 53v)
33. *Stapelia arida* = *Stapelia arida* Masson (Bl. 55)
34. *Stapelia incarnata* = *Stapelia incarnata* L.f. ?; syn.: *Quaqua incarnata* L.f. Bruyns ? (Bl. 56v)
35. *Stapelia parviflora* = *Quaqua parviflora* (Masson) Bruyns subsp. *parviflora* (Masson) Bruyns (Bl. 58)
36. *Stapelia pulchella* = *Orbea pulchella* (Masson) Leach (Bl. 59v)
37. *Stapelia aperta* = *Stapelia aperta* Masson; syn.: *Tromotriche aperta* (Masson) Bruyns (Bl. 61)
38. *Stapelia mixta* =.: *Orbea mixta* (Masson) Haworth; syn.: *Stapelia variegata* var. *mixia* (Masson) N. E. Brown (Bl. 62v)
39. *Stapelia sororia* = *Stapelia hirsuta* L. var. *hirsuta* (Bl. 64)
40. *Stapelia Gordonii* = *Hoodia gordonii* (Masson) Sweet ex Decne (Bl. 65v)
41. *Stapelia pruinosa* = *Stapelia pruinosa* Masson; syn.: *Quaqua pruinosa* (Masson) Bruyns, *Caralluma pruinosa* (Masson) N. E. Brown (Bl. 67)

Francis Masson (Masson), schottischer Gärtner und Botaniker, als erster Pflanzensammler 1772 im Auftrag des Botanischen Gartens in Kew auf Reisen geschickt. Sammelte Pflanzen in Südafrika, Westindien und Nordamerika. 1796 Beginn der Herausgabe seines Prachtbandes *Stapelia novae*, mit Beschreibung zahlreicher neuer Arten der Gattung *Stapelia*. Die Gattung *Stapelia* (Ordensstern- oder auch Aaspflanze) wurde von Linné nach dem niederländischen Arzt und Botaniker Johannes van Stapel [1806-1819, hatte die Pflanze 1644 unter dem Namen *Fritillaria crassa* bekannt gemacht] benannt und gehört zur Familie der Seidenpflanzen. Ihr Verbreitungsgebiet ist die Südhälfte Afrikas. Um 1810 waren in Europa schon über 60 Arten von Stapelien bekannt, die als exotische Modeblumen sehr beliebt waren.

41 Farbtafeln, alle bis auf eine Ausnahme von Masson selbst gezeichnet. Abschrift bzw. Zeichnungen von Heinrich Ludolph Wendland laut eigenem Eintrag auf Bl. 2: „Fecit H.L. Wendland. 1814“ (H. L. Wendland war bis 1. Mai 1814 in Wien am Botanischen Garten und nach seiner Rückkehr nach Herrenhausen bis zu seinem knapp einjährigen Englandaufenthalt (Juli/August 1815 bis April/Mai 1816) ein gutes Jahr im Berggarten beschäftigt). In Wien hatte der Kaiserliche Hofgärtner Schott eine große Sammlung zusammengetragen. Dort war auch 1806 ein weiterer Prachtband von Nikolaus von Jacquin erschienen (KGBH-293), der Abbildungen und Beschreibungen von 48, in den Kaiserlichen Gärten in Wien und Schönbrunn kultivierten Arten enthielt.

Überlieferungsart: Abschrift, angefertigt von Heinrich Ludolph Wendland 1814, vermutlich in Wien

Bildliche Darstellungen: Zeichnungen: 41 (2 gefaltete) Aquarelle (Bleistift und Wasserfarbe) von Heinrich Ludolph Wendland nach den Farbtafeln des Originals.

Datierung: 1796 [Abschrift: 1814]

Beschreibstoff:

Umfang: Bl. 1 unbeschrieben, Bl. 2- 68, Bl. 69 unbeschrieben

Größe in mm: 295 x 230 (Schriftspiegel: 228 x 172; Bl. 22. 363 x 230, gefaltet; Bl. 25. 215 x 349, gefaltet)

Entstehungsort: London [Abschrift: vermutlich Wien, vielleicht auch Herrenhausen]

Zusammensetzung der Handschrift: Text beidseitig (Vorder- und Rückseite); Zeichnungen auf jeweils einem Blatt (Rückseite unbeschrieben)

Einband: Halbleder mit farbigem Rückenschild und Rückenvergoldung

Geschichte (Besitzeinträge etc.):

Relation:

Literatur: Masson, Francis: *Stapelia novae*, or a collection of several new species of that genus discovered in the interior of Afrika. London 1796.

Jacquin, Nikolaus Joseph v.: *Stapelarium in hortis Vindobonensibus cultarum descriptiones*. Wien 1806 [-19] (KGBH-293)

Salm-Reifferscheid-Dyck, J. zu: *Monographia generum Aloes et Mesembrianthemi*, 7 Bde, Bonn, 1836-63. (KGBH-557)

Willdenow, Carl Ludwig: *Hortus Berolinensis*,... Berlin 1806 [-16] (KGBH-729)

N.N. [T-r] Über die Stapelien, in: *Allgemeines Teutsches Garten-Magazin*, 7. Jg., XI. Stück, Weimar 1810.