

In vniuersum itaque octo hic Numerus 666. subiicitur generibus, & in omnibus, quod vbique contingit, excepto trigonali, diuisionibus *Quotiens* & numerum Tabulæ, & differentiam Progressionis, ex qua oritur: *Residuum* in radicum columna antèrius extra tabulam posita (cui literas, quia ad exercendum Lectorem, Nomen nostrum istis Radicibus sub finem huius scripti inclusimus, ascripsimus) Radicem, *Diuisor* progressionis per sequentes Tabulas differentiam, *Collectum* ex diuifore & residuo primum illius progressionis terminum, & inferiùs sub eadem columna Genus Numeri (quod & ipse diuifor præstat) dextèri imè notabit.

Hæc secundo & quarto Genere Numeri 666. declarabimus, & eo, quomodo Tabulæ conficiendæ, monstrabimus, vt quisque, prout suo se loco Numerus prodar, videre possit.

Genus II.	Tab. 221.	Genus IV.	Tab. 165.
(3	1 1 1	22	1 1 1
666 221	2 22 23	66 (6) 65	2 166 167 168
3 3 3	3 443 666	44 4	3 331 498 666
Hic <i>Quotiens</i> Tabulam 221. & differentiam 221. <i>Residuum</i> 3. antèrius in tabula seu radicum columna, radicem 3. diuifor 2. inferiùs polygonalem numerum esse indicat.	radix. progr. ex diff. 221.	Huius diuisionis <i>Quotiens</i> Tabulam 165. & differentia 165. <i>Residuum</i> 6. antèrius in Radicum columna radicem 3. diuifor 4. inferiùs pyramidalem numerum esse oñdit.	radix. progr. ex diff. 165.
	diacofaico trigonales		hecatohexicoheptagonalis pyramidales ex hecat.

His demonstrationem adijcere superuacaneum, siquidem omnia tam perspicua & manifesta, vt quisque lubens meritoque acquiescere debeat: omnia enim in sola additione subsistunt. Cùm autem plurimi sciorum etiam 1. & 2. addita, tria conficere, credere nolint, aliquid addã. Scribit a. Euclides lib. 2. propo. 7. Si recta linea secta sit vtrunque, & triangula, quæ sub tota & quolibet segmentorum comprehenduntur, equalia sunt eis quod à toto fit, Quadrato.

